

# GORDOLOT GRÃO INTEIRO 32

## Indicação

Gordolot Grão Inteiro 32 é um concentrado proteico com 32% de PB, proteína verdadeira, ureia pecuária e de liberação lenta, macro (como potássio) e microminerais, com destaque para o cromo orgânico, vitaminas, monensina sódica e aditivo probiótico. Indicado para formulação de dieta sem volumoso, para bovinos em regime de confinamento, ingerindo grãos de milho inteiro, da fase de engorda.

## Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	320g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	155g
NDT estimado (Mín)	530g
Extrato Etéreo (Mín)	20g
Fibra Bruta (Máx)	90g
FDA (Máx)	100g
Matéria Mineral (Máx)	200g
Cálcio (Mín)	25g
Cálcio (Máx)	40g
Fósforo (Mín)	6.000mg
Enxofre (Mín)	6.500mg
Magnésio (Mín)	4.500mg
Sódio (Mín)	7.500mg
Potássio (Mín)	15g
Vitamina A (Mín)	11.140U.I
25-Hidroxitamina D3 (Mín)	1.390U.I
Vitamina E (Mín)	61,5U.I
Zinco (Mín)	188mg
Cobre (Mín)	62,5mg
Manganês (Mín)	125mg
Selênio (Mín)	1,5mg
Ferro (Mín)	125mg
Cobalto (Mín)	1,8mg
Iodo (Mín)	3,10mg
Cromo (Mín)	2,4mg
Saccharomyces cerevisiae (Mín)	2,69E9UFC
Monensina Sódica	160mg



Ração para fêmeas no período pré-parto

**GORDOLOT GRÃO INTEIRO 32**

## Modo de uso

Para formular dieta sem volumoso de bovinos em confinamento, misturar 18% de Gordolot Grão Inteiro 32 em 82% de milho grão inteiro (MISTURA). Para arrastar animais em fase final de engorda, o período de adaptação deve ser de ao menos 2 semanas, indicando-se: 1) Volumoso não proveniente do piquete, fornecer do 1º - 4º dia 1,2% do peso vivo (PV) da MISTURA+1,0% do PV, com base na matéria seca, de volumoso (ex: feno, silagem ou bagaço de cana-de-açúcar). Do 5º - 8º dia fornecer 1,4% da MISTURA+0,8% de volumoso. Do 9º - 12º dia fornecer 1,6% da MISTURA+0,6% de volumoso. Do 13º - 15º dia fornecer 1,8% da MISTURA+0,2% de volumoso. A partir do 16º fornecer apenas a MIST. 2) Adaptação no piquete, realizar o aumento gradativo da seguindo o raciocínio anterior. Considerar 1 hectare por cada 25 a 30 animais (avaliar oferta de forragem do piquete). Após 16 dias, animais devem consumir somente a MISTURA. O consumo após adaptação variará de 1,8 - 2,2% do PV animal.

Peso

30 kg