

# GUABITECH RUMILEITE

## Indicação

GuabiTech Rumileite é uma ração inicial multipartícula, com 20% de PB, milho e aveia laminada, macro e microminerais (inorgânicos e orgânicos), destacando cromo orgânico, vitaminas A, D3, E, complexo B, lasalocida sódica, probiótico, prébiotico e adsorvente de micotoxinas. Indicada para bezerras (os) de alto potencial genético, do 4º dia de vida até o 6º mês de idade.

## Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	200g
Extrato Etéreo (Mín)	33g
Fibra Bruta (Máx)	80g
FDA (Máx)	100g
Matéria Mineral (Máx)	85g
Cálcio (Mín)	10g
Cálcio (Máx)	15g
Fósforo (Mín)	6.000mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.700mg
Cobalto (Mín)	0,50mg
Cobre (Mín)	16,5mg
Iodo (Mín)	1,1mg
Manganês (Mín)	18mg
Zinco (Mín)	68,2mg
Selênio (Mín)	0,59mg
Cromo (Mín)	0,70mg
Vitamina A (Mín)	8.500U.I
Vitamina D3 (Mín)	850U.I
Vitamina E (Mín)	60U.I
Tiamina (B1) (Mín)	3,4mg
Riboflavina (B2) (Mín)	4,0mg
Niacina (Mín)	17mg
Pantotenato de Cálcio (Mín)	7,8mg
Piridoxina (B6) (Mín)	2,6mg
Biotina (Mín)	0,10mg
Ácido Fólico (Mín)	0,38mg
Vitamina B12 (Mín)	65,4mcg
Mananoligossacarideo (Mín)	54,8mg
Saccharomyces cerevisiae (Mín)	8.14E+08 UFC
Lasalocida Sódica	45mg
Betaglucanas	171,5mg

## Modo de uso

Durante os 3 primeiros dias de vida, quando na presença da mãe, fornecer colostro à vontade. Em caso de aleitamento artificial, fornecer de 4 a 6 L de colostro, nas primeiras 24 h. Do 4º ao 30º dia de idade fornecer GuabiTech Rumileite a livre acesso, água e 12 a 15% do peso vivo (PV) em leite ou sucedâneo. Dos 31 aos 60 dias, fornecer ração, água e 6 a 8% do PV em leite ou sucedâneo. Dos 61 aos 90 dias fornecer ração, volumoso de qualidade, água e 3 a 4% do PV em leite ou sucedâneo. A partir do 91º dia ou momento em que o animal estiver consumindo acima de 1,0 kg/dia de GuabiTech Rumileite, o fornecimento do leite pode ser interrompido. O consumo de ração, a partir do desaleitamento, irá variar de 1,5 a 3,0 kg/animal/dia. O consumo da ração não deve exceder 2,0% do PV. Fornecer feno ou capim picado a partir do 2º mês de idade. Silagem deve ser fornecida a partir do 4º mês de idade. Disponibilizar suplemento mineral com alto teor de fósforo, a livre acesso.

## Peso

30 kg

