

GUABITECH RUMINA STARTER

Indicação

GuabiTech Rumina Starter é uma ração inicial multipartícula com 18% de PB e Milho Laminado. Possui Macro e Microminerais (inorgânicos e orgânicos), com destaque para o Cromo Orgânico, bem como vit. A, D3, E e as do complexo B. Contempla ainda Lasalocida sódica, os aditivos (Probiótico e Prébiotico) e Adsorvente de Micotoxinas. É indicada para atender as exigências nutricionais de bezerras (os) de alto potencial genético, do 4º dia de vida até o 6º mês de idade.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	180g
Extrato Etéreo (Mín)	30g
Fibra Bruta (Máx)	85g
FDA (Máx)	105g
Matéria Mineral (Máx)	90g
Cálcio (Mín)	10g
Cálcio (Máx)	15g
Fósforo (Mín)	6.000mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Enxofre (Mín)	2.000mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Cobalto (Mín)	0,50mg
Cobre (Mín)	16,5mg
Iodo (Mín)	1,1mg
Manganês (Mín)	18mg
Zinco (Mín)	68,2mg
Selênio (Mín)	0,59mg
Cromo (Mín)	0,70mg
Vitamina A (Mín)	8.500U.I
Vitamina D3 (Mín)	850U.I
Vitamina E (Mín)	59U.I
Tiamina (B1) (Mín)	3,4mg
Riboflavina (B2) (Mín)	4,0mg
Niacina (Mín)	17mg
Pantotenato de Cálcio (Mín)	7,8mg
Piridoxina (B6) (Mín)	2,6mg
Biotina (Mín)	0,10mg
Ácido Fólico (Mín)	0,38mg
Vitamina B12 (Mín)	65,4mcg
Mananoligossacarideo (Mín)	54,8mg
Saccharomyces cerevisiae (Mín)	8,14E+08 UFC
Lasalocida Sódica	45mg
Betaglucanas	171,5mg



Modo de uso

Durante os 3 primeiros dias de vida, quando na presença da mãe, fornecer colostro à vontade. Em caso de aleitamento artificial, fornecer de 4 a 6 L de colostro, nas primeiras 24 h. Do 4º ao 30º dia de idade fornecer GuabiTech Rumina Starter a livre acesso, água e 12 a 15% do peso vivo (PV) em leite ou sucedâneo. Dos 31 aos 60 dias, fornecer ração, água e 6 a 8% do PV em leite ou sucedâneo. Dos 61 aos 90 dias fornecer ração, volumoso de qualidade, água e 3 a 4% do PV em leite ou sucedâneo. A partir do 91º dia ou momento em que o animal estiver consumindo acima de 1,0 kg/dia de GuabiTech Rumina Starter, o fornecimento do leite pode ser interrompido. O consumo de ração, a partir do desaleitamento, irá variar de 1,5 a 3,0 kg/animal/dia. O consumo da ração não deve exceder 2,0% do PV. Fornecer feno ou capim picado a partir do 2º mês de idade. Silagem deve ser fornecida a partir do 4º mês de idade. Disponibilizar suplemento mineral com alto teor de fósforo, a livre acesso.

Peso

30 kg