

LACTAGE 22

Indicação

Lactage 22 é uma ração com 22% de proteína bruta, ureia pecuária e ureia pecuária de liberação lenta, macro e microelementos minerais, vitaminas (A, D3, E, biotina), adsorvente de micotoxinas e monensina sódica. Indicada para vacas leiteiras de alto potencial de produção ou àquelas de média produção no terço inicial da curva de lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	220g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	32,6g
Extrato Etéreo (Mín)	32g
Fibra Bruta (Máx)	70g
FDA (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	80g
Cálcio (Mín)	8.000mg
Cálcio (Máx)	15g
Fósforo (Mín)	5.500mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Vitamina A (Mín)	8.010U.I
25-Hidroxivitamina D3 (Mín)	2.385U.I
Vitamina E (Mín)	42U.I
Biotina (Mín)	1,5mg
Manganês (Mín)	61mg
Zinco (Mín)	94mg
Ferro (Mín)	38mg
Cobre (Mín)	28mg
Cobalto (Mín)	0,60mg
Iodo (Mín)	1,13mg
Selênio (Mín)	0,80mg
Betaglucanas (Mín)	221mg
Monensina Sódica	30mg



Fabricado sob licença da Guzabi
LACTAGE 22

Modo de uso

Fornecer em média 1,0 kg de Lactage 22 para cada 3,0 kg de leite. Na fase inicial da lactação fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite. Do 101º ao 240º dia, fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite. A quantidade dependerá da condição corporal, valor nutricional e quantidade do volumoso, e demais ingredientes, bem como fase da lactação. O consumo irá variar de 6,5 a 13 kg/vaca/dia. Para evitar distúrbios metabólicos adaptar por pelo menos 14 dias, com aumento gradativo da ração. Em caso de interrupção no fornecimento, reiniciar a adaptação.

Peso

30 kg