

LACTAGE NOVILHA

Indicação

Lactage Novilha é uma ração peletizada, formulada com 18% PB, macro e microelementos minerais, vitaminas (A, D3 e E) e lasalocida sódica. Indicada para novilhas de raças leiteiras com aproximadamente cinco meses de idade até 21 dias que antecedem o parto. Também recomendada para vacas secas, do momento da secagem até o 21º dia que antecedem o parto.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	180g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	26,7g
Extrato Etéreo (Mín)	25g
Fibra Bruta (Máx)	80g
Matéria Mineral (Máx)	115g
Cálcio (Mín)	10g
Cálcio (Máx)	20g
Fósforo (Mín)	6.000mg
FDA (Máx)	100g
Sódio (Mín)	3.500mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.700mg
Vitamina A (Mín)	8.514U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.538U.I
Vitamina E (Mín)	45U.I
Cobalto (Mín)	0,60mg
Cobre (Mín)	28mg
Ferro (Mín)	38mg
Iodo (Mín)	1,13mg
Manganês (Mín)	61mg
Selênio (Mín)	0,80mg
Zinco (Mín)	94mg
Lasalocida Sódica	45mg



Modo de uso

Para novilhas de raças leiteiras, fornecer de 0,5 a 1,5% do seu peso vivo (PV) de Lactage Novilha. A quantidade dependerá da condição corporal e valor nutricional do volumoso. Sendo silagem de milho e/ou sorgo, o fornecimento da ração irá variar de 0,5 a 1,0% PV. Sendo silagem de capim, cana-de-açúcar e/ou pastagem, o fornecimento irá variar de 1,0 a 1,5%. Para evitar o acúmulo de gordura no úbere é sugerido ganho de peso diário entre 0,75 e 0,80 kg, para raças grandes. No caso de vacas secas, fornecer de 0,5 a 1,0% PV da ração. O consumo de Lactage Novilha irá variar de 2,0 a 5,0 kg/animal/dia. Para evitar distúrbios metabólicos é importante à adaptação da flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e a ureia. O período de adaptação recomendado deve ser de pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração.

Peso

40 kg