

GUABITECH GRÃO INTEIRO 36

Indicação

GuabiTech Grão Inteiro 36 é um concentrado proteico, com 36% de proteína bruta. Formulado com Proteína Verdadeira, Ureia Pecuária, Macro (dentre eles Potássio) e Microminerais (inorgânicos e orgânicos), com destaque para o Cromo Orgânico, Vitaminas, Monensina Sódica, Aditivos (Probiótico e Prebiótico) e Adsorvente de micotoxinas. Indicado para formulação de dieta sem volumoso, para bovinos em regime de confinamento, ingerindo grãos de milho inteiro, da fase de engorda.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	360g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	155g
Extrato Etéreo (Mín)	20g
Fibra Bruta (Máx)	90g
FDA (Máx)	100g
Matéria Mineral (Máx)	200g
Cálcio (Mín)	30g
Cálcio (Máx)	50g
Fósforo (Mín)	8.000mg
Sódio (Mín)	10g
Potássio (Mín)	18g
Enxofre (Mín)	8.500mg
Magnésio (Mín)	6.000mg
Cobalto (Mín)	2,1mg
Cobre (Mín)	72,1mg
Iodo (Mín)	4,6mg
Manganês (Mín)	79,1mg
Selênio (Mín)	0,86mg
Zinco (Mín)	215,3mg
Cromo (Mín)	3,2mg
Vitamina A (Mín)	14.800 U.I
Vitamina D3 (Mín)	1.850 U.I
Vitamina E (Mín)	82U.I
Mananoligossacarideo (Mín)	241,5mg
Saccharomyces cerevisiae (Mín)	3,59E+09 UFC
Monensina Sódica	200mg
Betaglucanas	756,2mg



Modo de uso

Para formular dieta sem volumoso, para bovinos em regime de confinamento, misturar 15% de GuabiTech Grão Inteiro 36 em 85% de milho grão inteiro - (MISTURA). Para o arraçoamento de animais em fase final de engorda, o período de adaptação deverá ser de pelo menos duas semanas, sendo indicado: 1) Volumoso não proveniente do piquete, fornecer do 1º ao 4º dia, 1,2% do peso vivo (PV) do animal da MISTURA + 1,0% do PV do animal, com base na Matéria Seca, de volumoso (ex: feno, silagem ou bagaço de cana-de-açúcar). Do 5º ao 8º dia fornecer 1,4% da MISTURA + 0,8% de volumoso. Do 9º ao 12º dia fornecer 1,6% da MISTURA + 0,6% de volumoso. Do 13º ao 15º dia fornecer 1,8% da MISTURA + 0,2% de volumoso. A partir do 16º fornecer somente a MISTURA. 2) Adaptação no piquete, realizar o incremento gradativo da MISTURA, seguindo o raciocínio anterior. Considerar 1,0 hectare para cada 25 a 30 animais (avaliar a oferta de forragem do piquete). Após 16 dias animais devem consumir somente a MISTURA. O consumo após adaptação irá variar de 1,8 a 2,2% do PV do animal.

Peso

30 kg