

LACTAGE PRÉ-PARTO

Indicação

Lactage Pré-parto é uma ração aniônica formulada com 20% PB, enriquecida com sais aniónicos, minerais e vitaminas (A, D3 e E). É indicada no período de transição (últimas três semanas que antecedem o parto) para novilhas e vacas secas. O objetivo é prevenir a ocorrência de distúrbios metabólicos, tais como febre do leite, retenção de placenta, dentre outros.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	200g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	22,5g
Extrato Etéreo (Mín)	28g
Fibra Bruta (Máx)	70g
Matéria Mineral (Máx)	135g
Cálcio (Mín)	30g
Cálcio (Máx)	35g
Fósforo (Mín)	6.000mg
FDA (Máx)	90g
Sódio (Mín)	2.500mg
Enxofre (Mín)	10mg
Magnésio (Mín)	6.000mg
Cloro (Mín)	18g
Vitamina A (Mín)	20.005U.I
Vitamina D3 (Mín)	5.960U.I
Vitamina E (Mín)	105U.I
Cobalto (Mín)	1,27mg
Cobre (Mín)	59,5mg
Ferro (Mín)	80mg
Iodo (Mín)	2,39mg
Manganês (Mín)	129mg
Selênio (Mín)	1,69mg
Zinco (Mín)	199mg



Modo de uso

Nos últimos 21 dias que antecedem o parto, iniciar o fornecimento da ração Lactage Pré-parto. A quantidade diária de ração aniônica irá variar de 3,0 a 5,0 kg/animal/dia, em função da condição corporal do animal e valor nutricional e quantidade do volumoso (dar preferência para silagem de milho ou sorgo, ao invés de capim). Ao adotar ração aniônica não é recomendado fornecer suplemento mineral linha branca contendo sódio aos animais. Logo após o parto, suspender o uso da Lactage Pré-parto e iniciar o fornecimento de ração destinada a lactação e suplemento mineral.

Peso

40 kg