

BEZERRÃO

Indicação

Bezerrão é uma ração inicial peletizada, formulada com 16% de PB, macro e microelementos minerais, vitaminas (A, D3, E e do complexo B) e Lasalocida Sódica. Indicada para atender as exigências nutricionais de bezerras (os) do 3º dia de vida até o 6º mês de idade.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	160g
Extrato Etéreo (Mín)	25g
Fibra Bruta (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	125g
Cálcio (Mín)	10g
Cálcio (Máx)	20g
Fósforo (Mín)	6.000mg
FDA (Máx)	110g
Sódio (Mín)	3.000mg
Enxofre (Mín)	2.000mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Vitamina A (Mín)	7.070U.I
Vitamina D3 (Mín)	707U.I
Vitamina E (Mín)	49U.I
Tiamina (B1) (Mín)	2,8mg
Riboflavina (B2) (Mín)	3,3mg
Piridoxina (B6) (Mín)	2,1mg
Vitamina B12 (Mín)	54mcg
Ácido Fólico (Mín)	0,31mg
Biotina (Mín)	0,08mg
Niacina (Mín)	14mg
Pantotenato de Cálcio (Mín)	6,5mg
Cobalto (Mín)	0,50mg
Cobre (Mín)	23,4mg
Ferro (Mín)	31mg
Iodo (Mín)	0,94mg
Manganês (Mín)	50,5mg
Selênio (Mín)	0,65mg
Zinco (Mín)	78mg
Lasalocida Sódica	35mg



Modo de uso

Durante os três primeiros dias de vida, quando na presença da mãe, fornecer colostro à vontade. Em caso de aleitamento artificial, fornecer de 3 a 4 L de colostro, nas primeiras 24 horas. Do 4º ao 30º dia de idade fornecer Bezerrão a livre acesso, água e 10 a 15% do peso vivo (PV) ao nascer em leite ou sucedâneo. Dos 31 aos 60 dias, fornecer ração, água e 5 a 10% do PV em leite ou sucedâneo. Dos 61 aos 90 dias fornecer ração, volumoso de qualidade, água e 3 a 5% do PV em leite ou sucedâneo. A partir do 91º dia ou momento em que o animal estiver consumindo acima de 1,0 kg de Bezerrão por dia, o fornecimento do leite pode ser interrompido. O consumo da ração não deve exceder 2,0% do PV. Fornecer feno ou capim picado a partir do 3º mês de idade. Silagem deve ser fornecida somente a partir do 4º mês de idade.

Peso

40 kg