

BEZERRÃO

Indicação

Bezerrão é uma ração inicial peletizada, formulada com 16% de PB, macro e microminerais de alta disponibilidade, com destaque ao cromo, vitaminas (A, D3, E e do complexo B) e lasalocida sódica. Indicada para atender as exigências nutricionais de bezerras (os) do 3º dia de vida até o 6º mês de idade..

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	160g
Extrato Etéreo (Mín)	25g
Fibra Bruta (Máx)	90g
FDA (Máx)	110g
Matéria Mineral (Máx)	125g
Cálcio (Máx)	20g
Cálcio (Mín)	10g
Fósforo (Mín)	6.000mg
Enxofre (Mín)	2.000mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Manganês (Mín)	19,0mg
Zinco (Mín)	39mg
Ferro (Mín)	19mg
Cobre (Mín)	15mg
Cobalto (Mín)	0,38mg
Iodo (Mín)	1,12mg
Selênio (Mín)	0,29mg
Vitamina A (Mín)	7.070U.I
Vitamina D3 (Mín)	707U.I
Vitamina E (Mín)	49U.I
Vitamina B1 (Tiamina) (Mín)	2,8mg
Vitamina B2 (Riboflavina) (Mín)	3,3mg
Vitamina B5 (Mín)	6,5mg
Vitamina B6 (Piridoxina) (Mín)	2,1mg
Biotina (Mín)	0,08mg
Niacina (Mín)	14mg
Ácido Fólico (Mín)	0,31mg
Vitamina B12 (Mín)	54mcg
Lasalocida	35mg

Modo de uso

Durante os três primeiros dias de vida, quando na presença da mãe, fornecer colostro à vontade. Em caso de aleitamento artificial, fornecer de 3 a 4 L de colostro, nas primeiras 24 horas. Do 4º ao 30º dia de idade, fornecer Bezerrão a livre acesso, água e 10 a 15% do peso vivo (PV) ao nascer em leite ou sucedâneo. Do 31º ao 60º dia, fornecer ração, água e 5 a 10% do PV em leite ou sucedâneo. Do 61º ao 90º dia, fornecer ração, volumoso de qualidade, água e 3 a 5% do PV em leite ou sucedâneo. A partir do 91º dia, ou do momento em que o animal estiver consumindo acima de 1,0 kg de Bezerrão por dia, o fornecimento do leite ou sucedâneo pode ser interrompido. O consumo da ração não deve exceder 2,0% do PV. Fornecer feno ou capim picado a partir do 3º mês de idade. Silagem deve ser fornecida somente a partir do 4º mês de idade.

Peso

30* e 40 kg (* Apenas na unidade de Sales Oliveira)

