

GUABITECH GRÃO INTEIRO 36

Indicação

Guabitech Grão Inteiro 36 é um concentrado proteico com 36% de PB, proteína verdadeira, ureia pecuária, macro e microminerais de alta biodisponibilidade, com destaque para o cromo, vitaminas (A, D3 e E), monensina sódica, aditivos (probiótico e prebiótico) e adsorvente de micotixinas. Indicado para formulação de dieta sem volumoso, para bovinos em regime de confinamento, ingerindo grãos de milho inteiro, da fase de engorda.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	360g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	155g
Extrato Etéreo (Mín)	20g
Fibra Bruta (Máx)	90g
FDA (Máx)	100g
Matéria Mineral (Máx)	200g
Cálcio (Máx)	50g
Cálcio (Mín)	30g
Fósforo (Mín)	8.000mg
Enxofre (Mín)	8.500mg
Magnésio (Mín)	6.000mg
Sódio (Mín)	6.000mg
Potássio (Mín)	18g
Manganês (Mín)	75mg
Zinco (Mín)	154mg
Ferro (Mín)	75mg
Cobre (Mín)	59,3mg
Cobalto (Mín)	1,5mg
Iodo (Mín)	4,4mg
Selênio (Mín)	1,13mg
Cromo (Mín)	3,0mg
Vitamina A (Mín)	14.800 U.I
Vitamina D3 (Mín)	1.850 U.I
Vitamina E (Mín)	82U.I
Monensina Sódica	200mg
Saccharomyces cerevisiae (Mín)	3,58E+09 UFC
Mananoligossacarideo (Mín)	241,5mg
Betaglucanas	756,2mg

Modo de uso

Para formular dieta sem volumoso de bov. em confinam., misturar 15% de Guabitech Grão Inteiro 36 em 85% de milho grão inteiro (MIST.). Para arraçãoar animais em fase final de engorda, o período de adaptação deve ser de ao menos 2 semanas, indicando-se: 1) Volumoso não proveniente do piquete, fornecer do 1º - 4º dia 1,2% do peso vivo (PV) da MIST.+1,0% do PV, com base na mat. seca, de volumoso (ex: feno, silagem ou bagaço de cana-de-açúcar). Do 5º - 8º dia fornecer 1,4% da MIST.+0,8% de volum. Do 9º - 12º dia fornecer 1,6% da MIST.+0,6% de volum. Do 13º - 15º dia fornecer 1,8% da MIST.+0,2% de volum. A partir do 16º fornecer apenas a MIST. 2) Adaptação no piquete, realizar o aumento gradativo da MIST. seguindo o raciocínio anterior. Considerar 1 hectare por cada 25 a 30 animais (avaliar oferta de forragem do piquete). Após 16 dias, animais devem consumir somente a MIST. O consumo após adaptação variará de 1,8 - 2,2% do PV animal.

Peso

30 kg

