

LACTAGE 18

Indicação

Lactage 18 é uma ração formulada com 18% de PB, ureia pecuária e de liberação lenta, macro e microminerais de alta disponibilidade, vitaminas (A, D3, E, biotina) e aditivo redutor de metano que potencializa a produção e qualidade do leite. Indicada para vacas leiteiras de alto potencial de produção ou vacas de média produção que se encontram no terço inicial da curva de lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	180g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	30,0g
Extrato Etéreo (Mín)	32g
Fibra Bruta (Máx)	70g
FDA (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	80g
Cálcio (Máx)	15g
Cálcio (Mín)	8.000mg
Fósforo (Mín)	5.500mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Manganês (Mín)	36mg
Zinco (Mín)	79,2mg
Ferro (Mín)	27mg
Cobre (Mín)	21,6mg
Cobalto (Mín)	0,55mg
Iodo (Mín)	1,08mg
Selênio (Mín)	0,72mg
Cromo (Mín)	0,72mg
Vitamina A (Mín)	8.010U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.385U.I
Vitamina E (Mín)	42,0U.I
Biotina (Mín)	1,5mg
Acetato de Geranil (Mín)	2,300mg
Eugenol (Mín)	2,875 mg
Geraniol (Mín)	2,300 mg
Óleo Essencial Coentro (Mín)	2,300 mg

Modo de uso

Para vacas de alto potencial de produção fornecer, em média, 1,0 kg de Lactage 18 para cada 3,0 kg de leite produzido. Na fase inicial da lactação (0-100 dias), fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5 kg de leite. Do 101° ao 240° dia, fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite. A quantidade de Lactage 18 irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como fase da lactação. Para evitar distúrbios metabólicos é importante a adaptação da flora microbiana às fontes de carboidratos não estruturais e ureia. O período de adaptação recomendado deve ser de pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração. Caso haja interrupção no fornecimento da ração, por período superior a dois dias, iniciar novo processo de adaptação.

Peso

40 kg

