

LACTAGE 20

Indicação

Ração formulada com 20% de PB, ureia pecuária e de liberação lenta, macro e microminerais de alta biodisponibilidade, Vit.s (A, D3, E e Biotina), adsorvente de micotoxinas, Ad. redutor de metano que potencializa a produção e qualidade do leite e monensina sódica. Indicada para vacas leiteiras de alto potencial de produção ou àquelas de média produção que se encontram no terço inicial da curva de lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	200g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	27,5g
Extrato Etéreo (Mín)	32g
Fibra Bruta (Máx)	70g
FDA (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	80g
Cálcio (Máx)	15g
Cálcio (Mín)	8.000mg
Fósforo (Mín)	5.500mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Manganês (Mín)	36mg
Zinco (Mín)	79,2mg
Ferro (Mín)	27mg
Cobre (Mín)	21,6mg
Cobalto (Mín)	0,55mg
Iodo (Mín)	1,08mg
Selênio (Mín)	0,72mg
Cromo (Mín)	0,72mg
Vitamina A (Mín)	8.010U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.385U.I
Vitamina E (Mín)	42,0U.I
Biotina (Mín)	1,5mg
Monensina Sódica	30mg
Acetato de Geranil (Mín)	2,300 mg
Eugenol (Mín)	2,875 mg
Geraniol (Mín)	2,300 mg
Óleo Essencial Coentro (Mín)	2,300 mg
Betaglucanas (Mín)	221mg

Modo de uso

Fornecer, em média, 1,0 kg de Lactage 20 para cada 3,0 kg de leite produzido. Na fase inicial da lactação, fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5 kg de leite. Do 101° ao 240° dia, fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite. A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso, e demais lngs da dieta, bem como fase da lactação. O consumo de Lactage 20 irá variar de 8,7 a 15 kg/vaca/dia. Para evitar distúrbios metabólicos, é importante adaptar a flora microbiana às fontes de carboidratos não estruturais e ureia. Adaptar por pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração. Caso haja interrupção no fornecimento da ração por período superior a 2 dias, iniciar novo processo de adaptação.

Peso

40 kg

