

LACTAGE 22 SE

Indicação

Lactage 22 SE é uma ração formulada com 22% de PB, ureia pecuária, macro e microminerais de alta biodisponibilidade, Vit.s (A, D3, E e biotina), adsorvente de micotoxinas, Ad. redutor de metano que potencializa a produção e qualidade do leite e monensina sódica. Ração indicada para vacas leiteiras de alto potencial de produção ou àquelas de média produção, no terço inicial da curva de lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	220g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	42,3g
Extrato Etéreo (Mín)	32g
Fibra Bruta (Máx)	70g
FDA (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	80g
Cálcio (Máx)	15g
Cálcio (Mín)	8.000mg
Fósforo (Mín)	5.500mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Manganês (Mín)	36mg
Zinco (Mín)	79,2mg
Ferro (Mín)	27mg
Cobre (Mín)	21,6mg
Cobalto (Mín)	0,55mg
Iodo (Mín)	1,08mg
Selênio (Mín)	0,72mg
Cromo (Mín)	0,72mg
Vitamina A (Mín)	8.010U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.385U.I
Vitamina E (Mín)	42,0U.I
Biotina (Mín)	1,5mg
Monensina Sódica	30mg
Acetato de Geraniol (Mín)	2,300 mg
Eugenol (Mín)	2,875 mg
Geraniol (Mín)	2,300 mg
Óleo Essencial Coentro (Mín)	2,300 mg
Betaglucanas (Mín)	325,0mg

Modo de uso

Vacas de alto potencial de produção fornecer em média 1,0 kg de Lactage 22 SE para cada 3,0 kg de leite. Fase inicial da lactação (0-100 dias) fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite. Do 100º aos 240 dias fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite. A quantidade de ração irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais lngs da dieta, bem como fase da lactação. O consumo de Lactage 22 SE irá variar de 8,7 a 13 kg/vaca/dia. Para evitar distúrbios metabólicos é importante adaptar a flora microbiana as fontes de carboidratos não estruturais e ureia. Adaptar por pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração. Caso haja interrupção no fornecimento da ração por período superior a 2 dias, iniciar nova adaptação.

Peso

40 kg

