

LACTAGE 22

Indicação

Lactage 22 é uma ração com 22% de PB, ureia pecuária e de liberação lenta, macro e microminerais de alta disponibilidade, Vit.s (A, D3, E, biotina), adsorvente de micotoxinas, Ad. redutor de metano que potencializa a produção e qualidade do leite e monensina sódica. Indicada para vacas leiteiras de alto potencial de produção ou àquelas de média produção no terço inicial da curva de lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	220g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	32,6g
Extrato Etéreo (Mín)	32g
Fibra Bruta (Máx)	70g
FDA (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	80g
Cálcio (Máx)	15g
Cálcio (Mín)	8.000mg
Fósforo (Mín)	5.500mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Sódio (Mín)	3.000mg
Manganês (Mín)	36mg
Zinco (Mín)	79,2mg
Ferro (Mín)	27mg
Cobre (Mín)	21,6mg
Cobalto (Mín)	0,55mg
Iodo (Mín)	1,08mg
Selênio (Mín)	0,72mg
Cromo (Mín)	0,72mg
Vitamina A (Mín)	8.010U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.385U.I
Vitamina E (Mín)	42,0U.I
Biotina (Mín)	1,5mg
Monensina Sódica	30mg
Acetato de Geranil (Mín)	2,300 mg
Eugenol (Mín)	2,875 mg
Geraniol (Mín)	2,300 mg
Óleo Essencial Coentro (Mín)	2,300 mg
Betaglucanas (Mín)	221mg

Modo de uso

Fornecer em média 1,0 kg de Lactage 22 para cada 3,0 kg de leite. Na fase inicial da lactação fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5kg de leite. Do 101° ao 240° dia, fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite. A quantidade dependerá da condição corporal, valor nutricional e quantidade do volumoso, e demais lngs, bem como fase da lactação. O consumo irá variar de 8,7 kg a 13 kg/vaca/dia. Para evitar distúrbios metabólicos adaptar por pelo menos 14 dias, com aumento gradativo da ração. Em caso de interrupção no fornecimento, reiniciar a adaptação.

Peso

40 kg

