

# LACTAGE NOVILHA

## Indicação

Lactage Novilha é uma ração peletizada, formulada com 18% de proteína bruta, ureia pecuária e de liberação lenta, macro e microminerais de alta disponibilidade, vitaminas (A, D3 e E) e lasalocida sódica. Indicada para novilhas de raças leiteiras com aproximadamente cinco meses de idade até 21 dias que antecedem o parto. Também recomendada para vacas secas, do momento da secagem até o 21º dia que antecedem o parto.

## Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	180g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	26,7g
Extrato Etéreo (Mín)	25g
Fibra Bruta (Máx)	80g
FDA (Máx)	100g
Matéria Mineral (Máx)	115g
Cálcio (Máx)	20g
Cálcio (Mín)	10g
Fósforo (Mín)	6.000mg
Enxofre (Mín)	2.200mg
Magnésio (Mín)	2.700mg
Sódio (Mín)	3.500mg
Manganês (Mín)	34mg
Zinco (Mín)	69,7mg
Ferro (Mín)	34mg
Cobre (Mín)	26,9mg
Cobalto (Mín)	0,68mg
Iodo (Mín)	2,01mg
Selênio (Mín)	0,51mg
Cromo (Mín)	1,360mg
Vitamina A (Mín)	8.514U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.538U.I
Vitamina E (Mín)	45,0U.I
Lasalocida	45mg

## Modo de uso

Para novilhas de raças leiteiras, fornecer de 0,5 a 1,5% do seu peso vivo (PV) de ração. A quantidade dependerá da condição corporal do animal e valor nutricional do volumoso. Com silagem de milho o consumo irá variar de 0,5 a 1,0% PV. Com silagem de capim ou pastagem o consumo irá variar de 1,0 a 1,5% PV. Para vacas secas, fornecer de 0,5 a 1,0% PV da ração. O consumo de Lactage Novilha irá variar de 2,0 a 5,0 kg/animal/dia. Para evitar distúrbios metabólicos, o período de adaptação deverá ser de pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração.

## Peso

40 kg

