

LACTAGE CONCENTRADO HP

Indicação

Lactage Concentrado HP é um concentrado proteico, formulado com 35% proteína bruta, ureia pecuária, macro e microminerais de alta disponibilidade, vitaminas (A, D3, E e biotina), monensina sódica, adsorvente de micotoxinas, aditivo probiótico e agente tamponante. Indicado no preparo de ração para vacas em lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	350g
NNP-Equiv. Proteína (Máx)	113g
Extrato Etéreo (Mín)	15g
Fibra Bruta (Máx)	100g
FDA (Máx)	120g
Matéria Mineral (Máx)	300g
Cálcio (Mín)	40g
Cálcio (Máx)	60g
Fósforo (Mín)	9.000mg
Sódio (Mín)	22g
Enxofre (Mín)	6.200mg
Magnésio (Mín)	12,5g
Cobalto (Mín)	2,75mg
Cobre (Mín)	108mg
Iodo (Mín)	5,4mg
Manganês (Mín)	180mg
Selênio (Mín)	3,6mg
Zinco (Mín)	396mg
Cromo (Mín)	3,6mg
Ferro (Mín)	135mg
Vitamina A (Mín)	40.050 U.I
Vitamina D3 (Mín)	11.925 U.I
Vitamina E (Mín)	210 U.I
Vit B7 (Biotina)	10mg
Saccharomyces cerevisiae (Mín)	2,5×10 ⁹ UFC
Betaglucanas (Mín)	1.560mg
Monensina Sódica	165mg

Modo de uso

Para confecção de rações para bovinos de leite, a inclusão de Lactage Concentrado HP em grãos de cereais moídos, farelos proteicos e subprodutos agroindustriais dependerá da produção de leite esperada, condição corporal do animal, fase da lactação e valor nutricional do alimento volumoso. O consumo de Lactage Concentrado HP, na mistura, irá variar de 1,5 a 2,5 kg/animal/dia. Para adaptação da flora microbiana a carboidratos não fibrosos e ureia, é necessário período de adaptação de pelo menos 14 diaa.

Peso 40 kg

